

ファイザー株式会社 新型コロナウイルスワクチンの接種の適応

接種が可能

- ・花粉症
- ・喘息
- ・アレルギー性鼻炎
- ・mRNAワクチンの成分以外
のものに対するアレルギー歴がある方
(薬、食べ物、ペット、虫、ラテックスなど)

→ アナフィラキシーをおこしたことが
ある人は接種後 30分 待機
それ以外の方は 15分 待機

以下の場合には接種を考慮してよい

- ・授乳中
 - ・妊娠中
 - ・免疫不全のある患者
- いずれも接種後 15分 待機

注意が必要

- ・中等度から重度の
急性期疾患のある人
- ・別のワクチンや注射薬に対して
即時型アレルギー反応
(アナフィラキシーなど)を
起こしたことがある人

→ ワクチン接種を取りやめるか
専門医に相談

→ 接種する場合、接種後
30分間 経過観察

接種不可(禁忌)

- ・1回目のmRNAワクチン接種で
重度のアレルギー反応 (アナ
フィラキシーなど) の出た人
- ・mRNAワクチンの成分
(PEGを含む)
に対して即時型アレルギー反応
があった人
- ・ポリソルベートに対して
即時型アレルギー
を起こしたことがある人

Based on CDC (<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html>)



出典：こびナビ (<https://covnavi.jp/>)